


CEBOLAS

Dentro do proxecto “Avaliación, selección e mellora de ecotipos locais de cebola (*Allium cepa*) de Galicia”, estase a traballar no **CIAM**, con 20 ecotipos de cebola autóctona, recolectados nas principais zonas produtoras de Galicia.

OBXECTIVOS:

- Avaliación morfolóxica e agronómica dos ecotipos locais recolectados, co fin de definir os ecotipos representativos, e definir as características tipo da cebola de Galicia.
- Selección e mellora das poboacións recolectadas, utilizando os ecotipos representativos co fin de obter variedades de polinización libre, de elevada homoxeneidade morfolóxica e organoléptica e de boa aptitude agronómica.
- Avaliación da aptitude para a conservación. Estudo e avaliación dos principais axentes fúnxicos que provocan perdas na conservación.





A GUARDA



- PROCEDENCIA:** A Guarda (Pontevedra).
- FORMA:** Eliptica transversal estreita.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 43,7-23,07 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Baixa.

Sección lonxitudinal



AMEIXENDA



- PROCEDENCIA:** Ameixenda (Cee) (A Coruña)
- FORMA:** Eliptica transversal
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo) : 61,7-23,8 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Baixa.

Sección lonxitudinal



ARCADE



-PROCEDENCIA: Arcade (Soutomaior) (Pontevedra).

-FORMA: Elíptica transversal.


-PRODUCCIÓN (Mabegondo): 41,5-23,2 tn/ha.

-CONSERVACIÓN: Baixa.

Sección lonxitudinal



BALDAIO



- PROCEDENCIA:** Baldaio.(A Coruña)
- FORMA:** Eliptica transversal estreita.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 41,5-23,2 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Baixa.

Sección lonxitudinal



BETANZOS




- PROCEDENCIA:** Betanzos (A Coruña).
- FORMA:** Elíptica transversal estreita.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 31,6-14,4 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Alta.

Sección lonxitudinal



BORDONS



-PROCEDENCIA: Bordons (Sanxenxo) (Pontevedra).

-FORMA: Rombica.

-PRODUCCIÓN (Mabegondo): 46,1-17,8 tn/ha.

-CONSERVACIÓN: Baixa.

Sección lonxitudinal



CALDAS



- PROCEDENCIA:** Caldas de Reis (Pontevedra).
- FORMA:** Elíptica transversal.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 48,2-18,8 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Media.

Sección longitudinal



CHATA-MIÑO



- PROCEDENCIA:** Leiro (Miño) (A Coruña)..
- FORMA:** Elíptica transversal estreita.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 35,9-12,2 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Media.

Sección lonxitudinal



MONDOÑEDO



- PROCEDENCIA:** Mondoñedo (Lugo)..
- FORMA:** Elíptica transversal estreita.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 36,7-13,9 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Baixa.

Sección lonxitudinal



OIMBRA



- PROCEDENCIA:** Oimbra (Ourense).
- FORMA:** Rómbica.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 55,7-15,7 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Baixa.

Sección lonxitudinal



OUTES



- PROCEDENCIA:** Outes (Noia) (A Coruña).
- FORMA:** Elíptica transversal e Rómbica.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 51,8-20,5 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Media.

Sección lonxitudinal



PONTEAREAS



- PROCEDENCIA:** Ponteareas (Pontevedra).
- FORMA:** Elíptica transversal estreita.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 34,7 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Baixa.

Sección lonxitudinal



RIBADEO



- PROCEDENCIA:** Piñeira (Ribadeo) (Lugo).
- FORMA:** Rómbica.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 38,7-13,2 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Alta.

Sección lonxitudinal



SAN. JULIÁN



- PROCEDENCIA:** San Julián (Sarria) (Lugo).
- FORMA:** Elíptica transversal estreita.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 44,6-15,6 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Alta.

Sección lonxitudinal



VILAGARCÍA



- PROCEDENCIA:** Vilagarcía (Pontevedra).
- FORMA:** Rómbica.
- PRODUCCIÓN** (Mabegondo): 39,6-22,3 tn/ha.
- CONSERVACIÓN:** Alta.

Sección lonxitudinal

