


PEMENTOS

No **CIAM**, dentro do proxecto INIA “Factores condicionantes da mellora da resistencia á enfermidade da tristeza en pementos autóctonos (*Capsicum annuum*) de Galicia e do País Vasco”, trabállase con 28 liñas de pementos autóctonos de Galicia: **Couto, Padrón, Arnoia, Branco Rosal, Oimbra, Mougán, Punxín e Piñeira**.

OBXECTIVOS

- Estudo dos factores que condicionan a mellora xenética da resistencia a *Phytophthora capsici* nos pementos autóctonos de Galicia e do País Vasco: Axentes causais, mecanismos de resistencia, selección e mellora recorrente.
- Estudo da interacción *Capsicum annuum* – *Verticilium dahliae*, avaliando a tolerancia das liñas de pementos autóctonos de Galicia e do País Vasco fronte a cepas do patóxeno recopiladas en Galicia.
- Caracterización morfolóxica e agronómica de diferentes liñas de pementos autóctonos de Galicia e do País Vasco, así como de algunhas variedades comerciais. Multiplicación para a obtención de semente, con fin de conservala no banco de xermoplasma do centro.



COUTO




PADRÓN




ARNOIA



OÍMBRA




BRANCO ROSAL



MOUGÁN





PUNXÍN



PIÑEIRA

PEMENTOS DE GALIZA



PEMENTO DE ARNOIA



Localidade:

Arnoia (Ourense)

Morfoloxía:

Sección lonxitudinal rectangular.

Lonxitude 7,5-11 cm.

Anchura: 5-6 cm.

Carne intermedia.

Rendemento*:

1,7 kg/planta.

Consumo:

Frito.

Sección lonxitudinal



PEMENTO BRANCO ROSAL



Localidade:

O Rosal (Pontevedra)

Morfoloxía:

Sección lonxitudinal triangular.

Lonxitude: 9-12,5 cm.

Anchura: 4-6 cm.

Carne intermedia.

Rendemento*:

2,5 kg/planta.

Consumo:

Frito.

Sección lonxitudinal



PEMENTO DO COUTO



COUTO

Localidade:

Couto. Narón (A Coruña)

Morfoloxía:

Sección lonxitudinal triangular.

Lonxitude: 4-8 cm.

Anchura: 2 cm.

Carne fina.

Rendemento*:

1,7 kg/planta.

Consumo:

Frito.

Sección lonxitudinal



PEMENTO DE MOUGÁN



MOUGÁN



Localidade:

Mougán. Guntín (Lugo).

Morfoloxía:

Sección lonxitudinal
cadrada.

Lonxitude: 5-6 cm.

Anchura: 4-5 cm.

Carne fina.


Rendemento*:

2,5 kg/planta.

Consumo:

Frito.

Sección lonxitudinal



PEMENTO DE OIMBRA



OÍMBRA

Localidade:

Oimbra (Ourense)

Morfoloxía:

Sección lonxitudinal triangular.

Lonxitude: 8-17 cm.

Anchura: 5-8 cm.

Carne grossa


Rendemento*:

4,7 kg/planta.


Consumo:

Frito. En conserva.

Sección lonxitudinal



PEMENTO DE PADRÓN



PADRÓN

Localidade:

Herbón. Padrón (A Coruña)

Morfoloxía:

Sección lonxitudinal
trapezoidal.

Lonxitude: 3,5-5 cm.

Anchura: 1,5-2 cm.

Carne: fina.

Rendemento*:

2,1 Kg/planta.

Consumo:

Frito.

Sección lonxitudinal



PEMENTO DE PIÑEIRA



PIÑEIRA

Localidade:

Piñeira. Ribadeo (Lugo)

Morfoloxía:

Sección lonxitudinal cadrada.

Lonxitude: 8-10 cm.

Anchura: 9-10 cm.

Carne grosa.


Rendemento*:

4,74 kg/planta.


Consumo :

Frito. En conserva.

Sección lonxitudinal



PEMENTO DE PUNXÍN



PUNXÍN

Localidade:

Punxín (Ourense)

Morfoloxía:

Sección lonxitudinal cadrada.

Lonxitude: 8-10 cm.

Anchura: 5-7 cm.

Carne intermedia.

Rendemento*:

2,2 kg/planta.

Consumo:

Frito.

Sección lonxitudinal

